

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要などきに読めるよう大切に保管してください。

傷口をピタッとガード！ ヒブールバン

第3類医薬品

【特徴】

1. 「あかざれ」、「さかむけ」、「ひび」、「切り傷」、「すりきず」にさっとお手当てできる
2. うすい被膜がバイ菌、ホコリなどの侵入を防ぎ、水に濡れてもしみない
3. 透明タイプで目立ちにくい



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には、使用しないでください。
 - (1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣など)
 - (2)ただれ、化膿している患部
 - (3)大きなきず、深いきず、湿疹および出血している患部
 - (4)顔面、頭部
 - (5)ひげそり、除毛、脱毛、脱色等により傷んだ皮ふ



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)本人または家族がアレルギー体質の人
 - (3)今までに薬や化粧品によるアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください。
 - (1)使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹、発赤、かゆみ、かぶれ、熱感

- (2)5～6日間使用しても症状の改善が見られない場合

【効能・効果】

あかざれ、さかむけ、ひび、小きりきず、すりきず

【用法・用量】

患部を清潔にし、傷部のみに適量を塗り、そのまま静かに乾燥させてください。

（用法・用量についての注意）

- (1)患部やその周辺が汚れたまま使用しないでください。
- (2)患部が汗や水でぬれている場合は水分をよく拭き取ってから使用してください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診断を受けてください。
- (4)外用にのみ使用し絶対に内服しないでください。
- (5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用してください。
- (6)傷口以外に広くぬらないでください。(皮ふ呼吸を抑えてしまう場合があります)
- (7)傷に塗った時、一瞬しみますが、乾燥するとしみなくなります。
- (8)固まった皮膜を無理にはがそうとすると、皮ふを傷つけてしまう可能性がありますので充分お気をつけください。
※急いではがしたい時は、ヒフルバンを上塗りし、乾かないうちに拭き取ってください。

【成分・分量】（100g中）

主 成 分	分 量
ピロキシリン	12g

添加物としてd ℓ -カンフル、ヒマシ油、ミリスチン酸イソプロピル、酢酸エチル、エタノールを含有する。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)高温・直射日光をさげ、涼しいところに密栓して保管してください。
(密栓しないと薬剤が固まる恐れがあります)
- (2)小児の手のとどかないところに保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)誤飲(指をしゃぶるなど)のおそれがある場合は使用をさけてください。
- (6)外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (7)衣類、家具、床等につくと、非常に取れにくく、色調に変化をきたす恐れがありますので、使用の際は充分に注意してください。

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店または下記にお願いいたします。

万協製薬株式会社

電話 0598-37-2088

受付時間 AM10:00～PM5:00

(ただし、土、日、祝日を除きます。)



発売元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元



万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142

A2305