

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈ひび・あかぎれ治療薬〉


ヒビヒフル

第3類医薬品

ヒビヒフルは、殺菌効果のあるイソプロピルメチルフェノール、消炎、鎮痛効果のサリチル酸メチル、患部の修復を促すトコフェロール酢酸エステルを配合したクリーム剤です。3つの効果がひび、あかぎれを効果的に改善します。

3つの効果でひび、あかぎれに効く

①殺菌効果




イソプロピルメチルフェノール
患部を殺菌します。

②消炎、抗炎症効果



サリチル酸メチル
腫れ・炎症を鎮めます。

③修復効果



トコフェロール酢酸エステル
患部の修復を促します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください。

- (1)目や目の周囲、粘膜(例えば唇等)
- (2)湿疹、かぶれ



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (3)薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4)湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください。
使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤・かゆみ

裏面もお読みください。

【効能・効果】

ひび、あかぎれ、しもやけ、かゆみ

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布または塗擦してください。

（用法・用量についての注意）

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用し内服しないでください。

【成分・分量】 100g中に次の成分を含みます。

成分	分量	はたらき
トコフェロール酢酸エステル	2.0g	血行を促進し、患部の修復を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌効果があります。
l-メントール	1.35g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。
dI-カンフル	9.6g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。
サリチル酸メチル	3.0g	痛みやはれを鎮めます。

添加物としてユーカリ油、テレピン油、ステアリン酸、ステアリアルアルコール、モノステアリン酸グリセリン、セチル硫酸ナトリウム、プロピレングリコール、トリエタノールアミン、カルボキシビニルポリマーを含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)高温・直射日光をさけ、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店または下記にお願いいたします。

万協製薬株式会社

電話 0598-37-2088

受付時間 AM10:00~PM5:00

(ただし、土、日、祝祭日を除きます。)



発売元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

<http://www.nippon-yakuhin.jp/>

製造販売元



万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142