

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 患部が化膿している人。2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれることがあります。) 4. 長期連用しないでください。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。排尿困難。(5) 次の診断を受けた人。緑内障。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
泌尿器	排尿困難
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。口のかわき、眠気 4. 10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【**効能・効果**】 きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

【**用法・用量**】 成人(15歳以上)1回1個を1日1~3回、肛門内に挿入してください。

【**用法及び用量に関連する注意**】 (1) 用法・用量を厳守してください。(2) 本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用してください。(3) 肛門にのみ使用してください。

【**成分・分量**】 1個(1.5g)中 ヒドロコルチゾン酢酸エステル 5mg、リドカイン 60mg、酸化亜鉛 80mg、イソプロピルメチルフェノール 2mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg、アラントイン 20mg、グリチルレチン酸 6mg、トコフェロール酢酸エステル 60mg 添加物として、ハードファットを含有します。

【**保管及び取扱い上の注意**】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない30℃以下の涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 保管する場合は、坐剤の先を下にむけてこの箱に入れ、マークに従って立てて保管してください。(4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。