

第2類医薬品 外用痔疾用薬

販売名: オノフェA 注入軟膏EX

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
 1. 次の人は使用しないでください。(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 患部が化膿している人。
 2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳薬、痰薬、鼻炎内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 使用后、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれることがあります) 4. 長期連用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。排尿困難。(5) 次の診断を受けた人。緑内障。2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
泌尿器	排尿困難
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気力が悪くなりかつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 使用后、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。口のかわき、眠気
 4. 10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

用法・用量

年齢	用法	1回量	1日使用回数
成人 (15歳以上)	注入	1個	1~2回
	塗布	適量	1~3回
15歳未満	使用しないこと		

【注入する場合】ノズル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入してください。

【塗布する場合】肛門部に塗布してください。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないでください。

〈用法及び用量に関連する注意〉 (1) 肛門部のみ使用してください。(2) 肛門内に注入する場合、ノズル部分のみを挿入して使用してください。(3) 用法・用量を厳守してください。

注入する場合

※全量を1回で注入してください。




①キャップを取りボディを挿し軟膏を少し先端部に出します。



②ノズルを肛門内に挿入しボディを押しゆっくり注入して押し込まないようにしてください。

塗布する場合

※一度塗布した容器は再度、注入に使わないでください。



①キャップを取り、軟膏をそのまま肛門部に塗布してください。



②ガーゼなどにのびして患部に貼ってください。

●本製品は注入式のため容器に軟膏が少し残りますが、残量を見込んで充てられています。また、寒い時期や低温で保管した場合は、軟膏が硬くなり、出しにくくなりますが手の中で容器を握って暖めると軟く出しやすくなります。

成分・分量

1個(2g)中 プレドニゾロン酢酸エステル 1mg、リドカイン 60mg、クロロフェニラミンマレイン酸塩 4mg、アラントイン 20mg、イソプロピルメチルフェノール 2mg、トコフェロール酢酸エステル 50mg
 添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、マクロゴール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、ワセリンを含有します。

開封

第②類医薬品

[15歳以上]

オノフェA 注入軟膏EX

製造販売元



万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142

万協製薬株式会社
「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



4 987754 104382

注入軟膏 2g×10個

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。開封後は品質保持のため、なるべく早く使用してください。
- (5) 使用済みの容器は、トイレに流さないでください。

上段は使用期限、
下段は製造番号です

