

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

〈痔疾用外用薬〉
痔の痛み・出血・はれ・かゆみに
レーバントH坐剤

第2類医薬品

■ヒドロコルチゾン酢酸エステル・リドカイン配合

- ◆**レーバントH坐剤**は、痔による痛み・出血・はれ・かゆみの症状に有効な6種の成分を配合した小さくて使いやすい痔の治療薬です。
- ◆**レーバントH坐剤**は体温ですみやかに溶けて患部に直接作用するようにつくられています。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 患部が化膿している人。
2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記のような重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、 顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦し さ等があらわれる。

- (2) 10日間位使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

用法・用量

成人(15歳以上): 1回1個を1日1~2回、肛門内に挿入してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。また、硬


- すぎるときには、軟らかくなった後に使用してください。
 (3) 肛門にのみ使用してください。

〔坐剤のとりだし方・挿入法〕

① 1個をミシン目から切りはなして、図のように合わせ目を左右に引きはがして坐剤をとり出してください。

② 坐剤の底を持ち、先から肛門内に入るまで、指で十分に押し込んでください。

- ・排便時の痛みが激しいときは、排便の前に挿入しておく、痛みをやわらげ便の通りをよくします。
- ・坐剤が外に出ないように挿入直後の激しい運動はなるべく避けるようにして下さい。
- ・挿入後の排便時に油のようなものが出ることがありますが、これは油脂性基剤の溶けたものですから心配ありません。



成分・分量


1個(1.2g)中

成分	含量	はたらき
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	5 mg	局所の炎症をおさえ、はれ・かゆみをしずめます。
リドカイン	60mg	局所の痛み、かゆみをしずめます。
トコフェロール酢酸エステル	50mg	末梢の血行をよくし、うっ血を改善します。
アラントイン	10mg	組織を修復して、傷の治りを早めます。
グリチルレチン酸	20mg	局所の炎症をおさえ、かゆみをしずめます。
ℓ-メントール	9 mg	局所に清涼感をもたらします。

添加物として、ハードファットを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない30℃以下の涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 保管する場合は、図のように坐剤の先を下にむけて外箱に入れ、外箱のマークに従って立てて保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)



治療のポイント

- 排便後は**レーパンGローション**で清拭して、肛門を常に清潔にしましょう。
- 入浴は患部の血行を改善するので、毎日入るよう心がけましょう。
- 便秘や下痢をしないよう心がけましょう。特に便秘の時には、煮た野菜や海藻類・果物等を多く食べ、便通をととのえましょう。
- アルコール類・刺激物(からし、わさび等)を多くとると、症状を悪化させることがあるので、なるべくひかえましょう。
- すわり続ける等、同じ姿勢で長くいると、肛門部がうっ血するため、症状を悪化させやすいので、時々体操や散歩等をして、体を動かしましょう。

本品についてのお問い合わせは
 お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

万協製薬株式会社

電話 0598-37-2088

受付時間 AM 10:00~PM 5:00

(ただし、土、日、祝祭日を除きます。)



発売元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元



万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142