

使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

## 痔疾治療薬

# レーバング軟膏

第2類医薬品

- ◆痔は肛門やその周辺に発生する病気の総称です。肛門は、排便という複雑な機能を果たすため、静脈が網の目のように集まっています。二本の足で上半身を支える人間は、ただでさえ肛門にうっ血が起こりやすいのですが、排便などで腹圧がかかるとさらにうっ血が起こり、これが痔の原因となります。痔は放っておいては慢性化して治りにくくなるので、日頃の養生と早めの手当が大切です。
- ◆**レーバング軟膏**は、痔の痛み、はれ、かゆみを緩和する成分を効果的に配合した、色のつかない軟膏です。



### 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	はれ、刺激感

- (2) 10日間位使用しても症状がよくなる場合

### 効能・効果

内痔核・外痔核・裂肛・脱肛・肛門湿疹・肛門掻痒・肛門潰瘍

### 用法・用量

1日1～2回、適宜量をそのまま塗布するか、ガーゼにのぼして貼布してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

肛門部にのみ使用してください。

## 成分・分量 (100g中)

成分	含量	はたらき
次硝酸ビスマス	10.0g	出血を止め、患部を保護します。
アミノ安息香酸エチル	5.0g	痔の痛み、かゆみを鎮めます。
ナファゾリン塩酸塩	0.02g	充血やはれを抑え、痔の不快感をとります。
オキシアミジン	0.5g	創面を治します。
ヨークレシチン	0.5g	局所に栄養を与え、傷の治りを早くします。
グリチルレチン酸	0.4g	局所のかゆみを鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	充血やはれを抑え、痔の不快感をとります。
龍腦	1.5g	患部の熱をとり、はれを鎮めます。

添加物として、マクロゴールを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

## 治療のポイント

- 排便後は**レーバンGRO-ション**で清拭して、肛門を常に清潔にしましょう。
- 入浴は患部の血行を改善するので、毎日入るよう心がけましょう。
- 便秘や下痢をしないよう心がけましょう。特に便秘の時には、煮た野菜や海藻類・果物等を多く食べ、便通をととのえましょう。
- アルコール類・刺激物(からし、わさび等)を多くとると、症状を悪化させることがあるので、なるべくひかえましょう。
- すわり続ける等、同じ姿勢で長くいると、肛門部がうっ血するため、症状を悪化させやすいので、時々体操や散歩等をして、体を動かしましょう。

本品についてのお問い合わせは  
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

**万協製薬株式会社**

電話 0598-37-2088

受付時間 AM10:00~PM5:00

(ただし、土、日、祝日を除きます。)



発売元

**日邦薬品工業株式会社**

東京都渋谷区代々木3-46-16

<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元



**万協製薬株式会社**

三重県多気郡多気町五桂1169-142